



ΑΓΡΟΑΝΑΛΥΣΗ

ΦΥΛΛΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ

Καλλιέργεια	Φυτικός ιστός - Εποχή δειγματοληψίας (Για τον Γεωπόνο)
Αμπέλι (όλες οι ποικιλίες)	φύλλα πλησίον ταξιανθίας , τέλος άνθησης φύλλα πλησίον βότρυος, Ιούνιος φύλλα πλησίον βότρυος, Ιούνιος
Αβοκάντο	ώριμα φύλλα μη καρποφόρων βλαστών, από δένδρα πλήρους αναπτύξεως, το φθινόπωρο
Αμυγδαλιά	φύλλα νέων βλαστών, μέσον θέρους
Αχλαδιά	φύλλα νέων βλαστών, μέσον θέρους
Ακτινιδιά (4 εβδομάδων)	Ολόκληρα, ώριμα φύλλα, 4 εβδ. μετά την έκπτυξή τους
Ακτινιδιά (άνοιξη)	Ολόκληρα, ώριμα φύλλα νέων βλαστών.
Ακτινιδιά (καλοκαίρι)	2ο φύλλο μετά τον τελευταίο καρπό του βλαστού
Αγγούρια αγρού (έναρξη ανθ)	5ο φύλλο από την κορυφή. Έναρξη ανθ. Έως σχηματισμό μικρού καρπού.
Αγγούρια θερμοκ. (άσπερμο)	Νέα ώριμα φύλλα. Καλοκαίρι.
Βαμβάκι	Ώριμα φύλλα του κυρίως στελέχους. Αρχές ανθίσεως.
Βερυκοκιά (εδώδ)	Φύλλα από το μέσον βλαστών νέας αναπτύξεως, μέσα Ιουλίου έως μέσα Αυγούστου
Βερυκοκιά (κονσεβ.)	Το ίδιο ως άνω
Βοτρυόκαρπος	Ώριμα φύλλα, καρποφόρων βλαστών. (5 - 7 μηνών)
Βυσσινιά	Ώριμα φύλλα νέας βλαστήσεως Ιούλιο - Αύγουστο
Δαμασκηνιά	Φύλλα νέας αναπτύξεως, Ιούλιο έως μέσα Αυγούστου
Ελιά	Ώριμα φύλλα ετησίων βλαστών. Αρχές χειμώνα (Οκτώβριο) ή Νοέμβριο.
Ζαχαρότευτλα	Φύλλα, 50 - 80 ημ. Μετά την σπορά. (Ιούνιος - Ιούλιος)
Καλαμπόκι (φυτά ύψους <30 εκ.)	Όλο το υπεργείο τμήμα
Καλαμπόκι (ξεστάχυσμα)	Φύλλα κάτω της κορυφής, πριν την εμφάνιση της άρρενος ταξιανθίας.
Καλαμπόκι (μετάξωμα)	Φύλλα σπάδικος, έναρξη εμφάνισης θήλεος ταξιανθίας.
Καπνός (Virginia)	Ώριμα φύλλα νέας αναπτύξεως, κατά την πλήρη άνθηση.
Καπνα Ανατολικά (40 ημ.)	Ώριμα φύλλα νέας αναπτύξεως, 30- 40 ημέρες μετά την φύτευση.
Καπνα Ανατολικά (60 ημ.)	Ώριμα φύλλα νέας αναπτύξεως, 40- 60 ημέρες μετά την φύτευση.
Καπνα Ανατολικά (80 ημ.)	Ώριμα φύλλα νέας αναπτύξεως, 60- 80 ημέρες μετά την φύτευση.
Καρπούζι (μικρός καρπός)	Ώριμα φύλλα νέας βλαστήσεως , Στάδιο μικρού καρπού.
Καρπούζι (έναρξη ανθίσεως)	5ο φύλλο από την κορυφή. Έναρξη ανθίσεως έως στάδιο μικρού καρπού.
Καρπούζι (μικρός καρπός έως συλλογή)	5ο φύλλο από την κορυφή. Στάδιο μικρού καρπού έως συλλογή.
Καρυδιά (<i>Junglans regia</i>)	Κεντρικά φυλλίδια από ώριμα σύνθετα φύλλα. Ιούλιο - Αύγουστο.
Καστανιά	Ώριμα φύλλα, μέσον ετησίων βλαστών Ιούλιο -Αύγουστο

Κερασιά	Ωριμα φύλλα νέας βλαστήσεως. Ιούλιο - Αυγούστο
Λεμονιά	Ωριμα φύλλα μη καρποφόρων βλαστών (5 - 7 μηνών)
Μανταρινιά	Το ίδιο όπως η λεμονιά
Μηδική προ ανθ.(15)	Κορυφή μήκους 15 εκ. της νέας βλαστ.
Μηδική προ ανθ.(ολοκλ)	όλο το υπέργειο μέρος του φυτού.
Μελιτζάνα (θερμ-αγρού)	Νέα πλήρως ανεπτυγμένα φύλλα. Έναρξη ανθίσεως έως καρπόδεση.
Μηλιά	Ωριμα φύλλα νέας βλαστήσεως. Θέρος
Πατάτα (φυτά <30 εκ.)	Νέα, πλήρως σχηματισμένα φύλλα. Φυτά ύψους 20-30 εκ.
Πατάτα (κόνδυλοι στο 1/2)	Νέα πλήρως σχηματισμένα φύλλα. Κόνδυλοι στο μισό του μεγέθους
Πιπεριά (έναρξη ανθίσεως)	Αγρού. Νέα, πλήρως ανεπτυγμένα φύλλα. Έναρξη ανθ. Έως καρπόδεση.
Πιπεριά (ώριμα φυτά)	Αγρού. Ωριμα φύλλα από ώριμα φυτά με μεγάλη παραγωγή.
Πεπόνι (έναρξη ανθίσεως)	5ο φύλλο από την κορυφή. Έναρξη ανθίσεως έως στάδιο μικρού καρπού.
Πεπόνι (μικρός καρπός έως συλλογή)	5ο φύλλο από την κορυφή. Στάδιο μικρού καρπού έως συλλογή.
Πορτοκαλιά (καρπ.βλαστοί)	Φύλλα βάσης καρπ.βλαστών. 5-7 μήνες από έναρξη βλαστών περιόδου.
Πορτοκαλιά (μη καρπ.βλαστοί)	Ωριμα φύλλα μη καρπ.βλαστών. Στο μέσον της βλαστικής περιόδου.
Ροδακινιά (καρπόδεση)	Φύλλα από το μέσον βλαστού. Άνοιξη στην καρπόδεση.
Ροδακινιά (μέσα καλοκαιριού)	Φύλλα από το μέσον καρποφόρων ή μη βλαστών. Μέσα θέρους.
Ρύζι (μέγιστο αδελφωμα)	Νέα, ώριμα φύλλα.
Ρύζι (εμφαν.ταξιανθίας)	Νέα, ώριμα φύλλα. Εμφ.ταξιανθίας
Σιτάρι (μαλακό - σκληρό - Triticale)	Τα δύο φύλλα κορυφής. Πριν από το ξεστάχυασμα.
Σπαράγγι	Σύνθετα φύλλα κορυφής. Αργά το θέρος, Αύγουστο έως Σεπτέμβριο.
Τομάτα βιομηχανική	Φύλλα κορυφής, μέσον ανθίσεως.
Τομάτα θερμ (προ καρποφ)	Νέα ώριμα φύλλα. Πριν την καρποφ.
Τομάτα θερμ 28 DAT	Νεώτερο ανοιγμένο φύλλο. 1η ανθοταξία.
Τομάτα θερμ 42 DAT	Νεώτερο ανοιγμένο φύλλο. 4η ανθοταξία.
Τομάτα θερμ 1ος ώριμ.καρπός	65-75 DAT. 1ος ώριμος καρπός. Νεώτερο ανοιγμένο φύλλο.
Τομάτα θερμ 112 DAT	Νεώτερο ανοιγμένο φύλλο. Προ της τελικής συλλογής.
Τομάτα αγρού	Μίσχοι συνθέτων φύλλων, απέναντι ή κάτω από την ταξιανθία Μέσον ανθίσεως.
Φασόλια (πρώτος καρπός)	Ανώτερα πλήρως ανεπτυγμένα τριπλά φύλλα
Φακή (άνθιση)	Νεώτερο ώριμο φύλλο
Σκόρδο (για βολβούς)	Νεώτερο ώριμο φύλλο, έναρξη σχηματισμού βολβού.

Τα φύλλα συλλέγονται σε καθαρές χάρτινες σακούλες και αποστέλλονται στο εργαστήριο αυθημερόν, ή διατηρούνται στο ψυγείο (συντήρηση) για 1-2 ημέρες.